

Lieber Patient, liebe Patientin,

Sie wurden heute in meiner Praxis mit dem Vektorimpfstoff gegen SARS-CoV-2 von Johnson geimpft. Dieser Impfstoff ist für alle Patienten, die 18 Jahre und älter sind zugelassen. Anbei erhalten Sie noch ein paar wichtige Informationen für zu Hause:

**Impfschutz:**

Wie bei jedem Impfstoff schützt eine Impfung mit der Covid-19 Vaccine Johnson&Johnson möglicherweise nicht alle Geimpften.

Der Schutz setzt ungefähr 2 Wochen nach der Impfung ein. Wirksamkeit gegen COVID-19 Erkrankung 66,9%, Wirksamkeit gegen schwere COVID-19-Verläufe: 76,7%. 4 Wochen nach der Impfung hat man eine Wirksamkeit gegen ein COVID-19 Erkrankung von 66,1 % und gegen schwere Verläufe 85,4%.

**Warnhinweise:**

Bitte suchen Sie umgehend einen Arzt auf wenn sie nach der Impfung Symptome wie Kurzatmigkeit, Brustschmerzen, Beinschwellungen oder anhaltende Bauchschmerzen entwickeln. Weiterhin ist ein Arzt zu konsultieren, wenn Sie neurologische Symptome wie starke oder anhaltende Kopfschmerzen oder verschwommenes Sehen, oder auf der Haut Blutergüsse außerhalb des Verabreichungsortes aufweisen.

Notfall: 116117

**mögliche Nebenwirkungen:**

- Schmerzen an der Injektionsstelle
- Müdigkeit
- Kopfschmerzen
- Erbrechen/Übelkeit/Schwindel
- verminderter Appetit

1. Impftermin: \_\_\_\_\_

2. Impftermin: \_\_\_\_\_